

OLIGOELEMENTOS

ALUMINIO

COMPOSICION: Gluconato de aluminio

INDICACIONES: En general favorece el funcionamiento intelectual, Retraso en el desarrollo intelectual en los niños, Falta de actividad mental, Aumenta la vitalidad cerebral y nerviosa, Esta indicado en los insomnios de tipo nervioso, distinto a los insomnios provocados por Intoxicación como en el caso de los hepáticos, estos serían insomnios de la diátesis I. También están los insomnios más rebeldes, cuando hay ya un daño en la estructura nerviosa producida por la migración de toxinas a este nivel. Este es el caso que se da en los insomnios y en los múltiples desarreglos nerviosos que encontramos en la diátesis III.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

AZUFRE

COMPOSICION: Gluconato De Azufre

INDICACIONES: Junto con el Manganeseo, es lo mejor que existe para desintoxicar el hígado y con él todo el organismo. Se debe pensar en él cuando comenzamos un tratamiento de una enfermedad crónica pues la limpieza del terreno es lo más importante.

La terapia de desintoxicación, que es media medicina se debe apoyar en el Azufre y el Manganeseo, ya sea dándolo junto como Manganeseo Azufre o por separado con intervalo de más de 15 minutos.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

BISMUTO

COMPOSICION: Gluconato De Bismuto

INDICACIONES: Tratamiento de la gastritis, más cuando se descubrió que eliminaba el Helicobacter Pylori. Lo debemos tener en cuenta en las gastritis, en los dolores gástricos, en los dolores abdominales y peritoneales y en la Enterocolitis. El Bismuto también se usa para calmar el vómito. Se utiliza en especial, en alteraciones de la esfera O.R.L. en general, con componente inflamatorio e infeccioso. Amigdalitis agudas o crónicas. Laringitis. Rinofaringitis. Muy importante en niños, en especial en: Amigdalitis aguda. Anginas herpéticas, estomatitis herpéticas y herpes a repetición. Mononucleosis infecciosa. Otitis aguda

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

BORO

COMPOSICION: Gluconato de Boro

INDICACIONES: Tratamiento de la osteoporosis junto con el Flúor. En la menopausia para aumentar niveles de hormonas femeninas y testosterona. En la impotencia del hombre y en los hombres de edad para aumentar los niveles de testosterona. En el tratamiento de la artritis y la artrosis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

COBALTO

COMPOSICION: Gluconato de Cobalto

INDICACIONES: Bloqueos digestivos y manifestaciones espasmódicas del tipo de la crisis de aerofagia, de hipo, etc. Espasmos y bloqueos vasculares y en particular en las manifestaciones de la artritis de los miembros inferiores. Para el tratamiento de la arteritis

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

COBRE

COMPOSICION: Gluconato de Cobre.

INDICACIONES: Es útil y eficaz en las manifestaciones infecciosas e inflamatorias crónicas acompañadas de un aumento importante de la velocidad de sedimentación. tratamiento de enfermedades infecciosas y en particular la gripe.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

COBRE-ORO-PLATA

COMPOSICIÓN: Gluconato de Cobre, Gluconato de Oro, Gluconato de Plata

INDICACIONES: Fatiga global que el reposo no basta para quitar. Neurastenia con fenómenos depresivos más o menos netos e ideas de muerte. Disminución de las facultades intelectuales o, por lo menos, dificultades para utilizarlas (memoria, facultad de la atención, coordinación, etc.). Desaparición del entusiasmo, tendencia a la abulia y sensación de la inutilidad de los esfuerzos. Impresión de la inutilidad de la existencia. Deseo de dimisión. Indiferencia sexual, aunque transitorios y entrecortados periodos de agresividad reaccional, estos fenómenos son todos signos de anergia. En el plano de la patología, la anergia conduce a todas las enfermedades evolutivas, lesivas y degenerativas. Tuberculosis, que evoluciona rápidamente, con tendencia a la generalización y falta de respuesta positiva a la terapéutica clásica

correctamente aplicada. Reumatismos crónicos inflamatorios; Ataques linfáticos, como la enfermedad de Hodgkin; Leucosis, los cánceres y, en general, todas las degeneraciones celulares; Senescencia global e irreductible; Psicosis con punto de partida depresivo

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

CROMO

COMPOSICION: Gluconato de Cromo

INDICACIONES: Es un oligoelemento que interviene en el metabolismo de los azúcares y de las grasas. El cromo mejora la acción de la insulina ayudando a disminuir la resistencia a la insulina. Es por disminuir la resistencia a la insulina que está indicado en el manejo de la obesidad y de la diabetes. Recordemos que los dos minerales más importantes para el diabético son el magnesio y el cromo

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

FLUOR

COMPOSICION: Gluconato de Fluor

INDICACIONES: El flúor es necesario para las enzimas que producen y conservan el colágeno y en general de todas las estructuras del tejido conectivo. Está pues al lado de la vitamina C, el cobre y la sílice. De gran utilidad para el tratamiento de las varices. A nivel osteoligamentario es de Retraso en la calcificación. Osteoporosis, Artrosis, retraso en la consolidación de fracturas.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

FÓSFORO

COMPOSICION: Gluconato de Fósforo

INDICACIONES: Es tónico por excelencia de los estados pretuberculínicos, también llamados fosfóricos, que se caracterizan por ser altos, delgados y tener el pecho estrecho. Los fosfóricos

tiene fobia a la soledad y su carácter es débil y agitado con reacciones violentas tanto físicas como psíquicas. Los fosfóricos son personas hipersensibles tanto en el plano físico como en el psíquico. Su principal característica es la debilidad irritable. "Parecen devorados por un fuego interior". Phosphorus se administra a los individuos del tipo fosfórico que padecen subidas de temperatura inexplicables y repetidas. En pacientes con tuberculosis el Phosphorus puede producir hemoptisis.

Phosphorus tiene una acción particular sobre el tejido pulmonar. Cuando se da a baja dinamización se puede administrar diariamente. Es el remedio de la ictericia grave y de las degeneraciones grasas del hígado, así como del mal de Bright y de todas sus complicaciones. Phosphorus es sobre todo un coagulante y un excelente remedio de la hemofilia porque es conveniente para todo tipo de hemorragias, si bien no debe olvidarse que sus indicaciones varían con las diluciones. Se aconseja su administración: Antes de una operación quirúrgica, ya que disminuye el tiempo de sangría y el de coagulación. Después de una operación, ya que disminuye las náuseas y los vómitos postoperatorios. Phosphorus disminuye y suprime todas las pérdidas de líquidos orgánicos (China), tales como la diarrea, deshidratación, pérdidas seminales, leucorreas, vómito y todas las hemorragias relacionadas con ellos. Es especial contra la albuminuria. Se usa en la lentitud cerebral, ataxia, vértigos, corea. Phosphorus corrige y disminuye: Los vértigos y temblores seniles

La afonía vespertina La intolerancia a los perfumes La hipertensión arterial.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

LITIO

COMPOSICION: Gluconato de Litio

INDICACIONES: Actúa sobre el sistema nervioso haciendo desaparecer lentamente el estado de excitación psíquica e hiperactividad psicósomática, sin producir depresión, sedación, ni indiferencia. Alteraciones de: La afectividad. Del comportamiento. Del sueño tanto en los niños como en los adultos. Disminución de las facultades intelectuales. Mongolismo. Retraso intelectual. Problemas de hiperansiedad y/o hiperemotividad. Mejora la eliminación urinaria, sobre todo la urea y el ácido úrico. Agitación. Agresividad. Inhibición. Muy útil en casos de: Angustia. Ansiedad. Inestabilidad emocional. Insomnio ansioso. Irritabilidad. Nerviosismos. Trastornos del sueño. Se utiliza sobre todo en psicosis maniaco-depresiva y en las depresiones severas recidivantes. Alteraciones psíquicas secundarias, esclerosis vasculares de la tercera edad. Prurito relacionado con la esfera psicoemocional. Psicopruritos. Psicodermatosis. Trastornos de la adaptación familiar. Trastornos del carácter (del niño, adulto o anciano). Trastornos del comportamiento: Fobias, manías, obsesiones. Trastornos psicósomáticos funcionales como: Cierta tipo de cefaleas. Espasmos digestivos. Espasmos musculares. Muy importante para niños especialmente en: Astenia-depresión-Ansiedad. En las colonpatías funcionales. Depresión y ansiedad. En los dolores abdominales sin causa. En la enuresis Hiperactividad y agitación. Insomnio y en las dificultades para dormir.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

MAGNESIO

COMPOSICION: Gluconato de Magnesio

INDICACIONES: Alteraciones de los niveles de potasio (hipotasemia). Bloqueo de la paratiroides. Espasmos. Temblor. Convulsiones. Irritabilidad neuromuscular. Simpaticotonia. Está presente en todas las Algias y en todos los espasmos tanto de la musculatura lisa como la estriada. Accidentes cardiovasculares. Trombosis. Terreno favorable al cáncer. Astenia Depresión. Agitación, Confusión. Vértigo. Labilidad emocional Arritmia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

MAGNESIO-COBALTO

COMPOSICION: Gluconato de Magnesio, Gluconato de Cobalto

INDICACIONES: Cobalto: Bloqueos digestivos y manifestaciones espasmódicas del tipo de la crisis de aerofagia, de hipo, etc.

Espasmos y bloqueos vasculares y en particular en las manifestaciones de la artritis de los miembros inferiores.

Para el tratamiento de la arteritis

Magnesio: Alteraciones de los niveles de potasio (hipotasemia). Bloqueo de la paratiroides. Espasmos. Temblor. Convulsiones. Irritabilidad neuromuscular. Simpaticotonia. Está presente en todas las Algias y en todos los espasmos tanto de la musculatura lisa como la estriada. Accidentes cardiovasculares. Trombosis. Terreno favorable al cáncer. Astenia. Depresión. Agitación, Confusión. Vértigo. Labilidad emocional. Arritmia.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

MAGNESIO-COBRE

COMPOSICION: Gluconato de Magnesio, Gluconato de Cobre

INDICACIONES: Magnesio: Alteraciones de los niveles de potasio (hipoastemia). Bloqueo de la paratiroides. Espasmos. Temblor. Convulsiones. Irritabilidad neuromuscular. Simpaticotonia. Está presente en todas las Algias y en todos los espasmos tanto de la musculatura lisa como la estriada. Accidentes cardiovasculares. Trombosis. Terreno favorable al cáncer. Astenia. Depresión. Agitación, Confusión. Vértigo. Labilidad emocional. Arritmia.

Cobre: Es útil y eficaz en las manifestaciones infecciosas e inflamatorias crónicas acompañadas de un aumento importante de la velocidad de sedimentación. tratamiento de enfermedades infecciosas y en particular la gripe.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

MAGNESIO-COBRE-COBALTO

COMPOSICION: Gluconato de Magnesio, Gluconato de Cobre, Gluconato de Cobalto

INDICACIONES: Magnesio: Alteraciones de los niveles de potasio (hipotasemia). Bloqueo de la paratiroides. Espasmos. Temblor. Convulsiones. Irritabilidad neuromuscular. Simpaticotonia. Está presente en todas las Algias y en todos los espasmos tanto de la musculatura lisa como la estriada. Accidentes cardiovasculares. Trombosis. Terreno favorable al cáncer. Astenia. Depresión. Agitación, Confusión. Vértigo. Labilidad emocional. Arritmia.

Cobre: Es útil y eficaz en las manifestaciones infecciosas e inflamatorias crónicas acompañadas de un aumento importante de la velocidad de sedimentación. tratamiento de enfermedades infecciosas y en particular la gripe.

Cobalto: Bloqueos digestivos y manifestaciones espasmódicas del tipo de la crisis de aerofagia, de hipo, etc. Espasmos y bloqueos vasculares y en particular en las manifestaciones de la artritis de los miembros inferiores. Para el tratamiento de la arteritis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

EL MANGANESO

COMPOSICION: Gluconato de Manganeso

INDICACIONES: Respiratorio. Asma alérgica producida por alérgenos exógenos. La sensibilización a estos alérgenos exógenos proviene de los residuos de ceras y lípidos de la micobacteria que actúa como adyuvante. Si no hay adyuvantes no se origina la alergia. Recuérdese que todas las vacunas llevan adyuvante (hidróxido de Aluminio) para que puedan inducir la producción de anticuerpos. Rinitis Tos de tipo alérgico.

Digestivo Alteraciones hepáticas con alteraciones digestivas variadas. Yo agrego que aunque no tenga síntomas digestivos que son los más comunes, se debe usar el manganeso y mejor aún el manganeso Azufre como tratamiento de base del hígado. (Véase lo dicho sobre el Azufre en lo tocante al tratamiento del hígado).

Cardiovascular. Variaciones tensionales tanto hipo como hiper, con síntomas de cefaleas, alteraciones visuales, vértigos y taquicardias. H. Picard asocia al Manganeso el Yodo. Inflamación de las arterias.

Genitourinario. Disfuncionamientos de la próstata.

Nervioso. Migrañas (con alteraciones digestivas, oftálmicas, atribuidas clásicamente al hígado).

Psiquismo. Comportamiento nerviosos, inestable, irascible en ocasiones.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

MANGANESO-COBALTO

COMPOSICION: Gluconato de Manganeso, Gluconato de Cobalto.

INDICACIONES: Sistema circulatorio: Trastornos circulatorios venosos capilares y arteriales periféricos. Pesadez de piernas, varices, calambres, síndromes de Raynaud, disestesias, arteritis, coronaritis. Trastornos circulatorios centrales. Hipertensión crónica, angor, tendencia a la arteriosclerosis. Cefaleas de origen circulatorio.

Aparato digestivo: Todas las manifestaciones distónicas epigástricas y abdominales, úlceras de estomago y de duodeno, disquinesias biliares y litiasis, colitis espasmódicas, rectocolitis, hinchazones de vientre.

Aparato urinario: Tests eliminadores perturbados, uremia, litiasis renal, úrica y oxálica, litiasis vesical.

Psiquismo y sistema nervioso: Ansiedad, pérdida de la memoria, irregularidades del carácter, insomnios, cambios de humor.

Piel: Algunos eczemas crónicos, en particular, aquellos que acompañan a los trastornos circulatorios de las piernas.

Aparato respiratorio: Paso del asma simple al enfisema.

Aparato osteo articular: Paso de las artritis que no implica lesión (astralgias fugaces) a la artritis con lesión de origen no inflamatorio: las artrosis y sus consecuencias diversas; entre las que figuran las manifestaciones neuríticas. La gota, la enfermedad de Paget.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

MANGANESO-COBRE

COMPOSICION: Gluconato de Manganeso, Gluconato de Cobre

INDICACIONES: Una sensibilidad particular de las vías respiratorias a las afecciones microbianas en general, desde las rinofaringitis frecuentes, hasta la tuberculosis en sus formas poco evolutivas. Las sinusitis, las anginas repetidas, las bronquitis crónicas y la dilatación de los bronquios.

El asma, ligada a manifestaciones bronquíticas o a fenómenos infecciosos de las vías respiratorias superiores. Las reacciones linfáticas y las adenopatías localizadas, poco evolutivas, poco supurantes. Los fenómenos enterocolíticos, con alternancia de diarrea y de estreñimiento.

Las cistitis reincidentes. Los hipotiroidismos fríos. Las hipomenorreas con reglas cortas y espaciadas. Ciertas afecciones cutáneas como el prurigo, acné, eczemas fácilmente infectados. En el plano del carácter y mental: las personas pesimistas, débiles, con dificultades para fijar su atención.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

MANGANESO-COBRE-COBALTO

COMPOSICION: Gluconato de Manganeso, Gluconato de Cobre, Gluconato de Cobalto.

INDICACIONES: Manganeso- Cobre: Una sensibilidad particular de las vías respiratorias a las afecciones microbianas en general, desde las rinofaringitis frecuentes, hasta la tuberculosis en sus formas poco evolutivas. Las sinusitis, las anginas repetidas, las bronquitis crónicas y la dilatación de los bronquios. El asma, ligada a manifestaciones bronquíticas o a fenómenos infecciosos de las vías respiratorias superiores. Las reacciones linfáticas y las adenopatías localizadas, poco evolutivas, poco supurantes. Los fenómenos enterocolíticos, con alternancia de diarrea y de estreñimiento. Las cistitis reincidentes. Los hipotiroidismos fríos. Las hipomenorreas con reglas cortas y espaciadas. Ciertas afecciones cutáneas como el prurigo,

acné, eczemas fácilmente infectados. En el plano del carácter y mental: las personas pesimistas, débiles, con dificultades para fijar su atención.

Cobalto: Bloqueos digestivos y manifestaciones espasmódicas del tipo de la crisis de aerofagia, de hipo, etc. Espasmos y bloqueos vasculares y en particular en las manifestaciones de la artritis de los miembros inferiores. Para el tratamiento de la arteritis.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

NIQUEL

COMPOSICION: Gluconato de Niquel.

INDICACIONES: Alteraciones en la digestión de las grasas. Estreñimiento con fuertes fermentaciones. Regulación del metabolismo pancreático.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

NIQUEL-COBALTO

COMPOSICION: Gluconato de Niquel, Gluconato de Cobalto

INDICACIONES: Actúa en las difíciles digestiones de grasas, lentitudes digestivas, deposiciones grasa, algunos estreñimientos y fermentaciones.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

POTASIO

COMPOSICIÓN: Gluconato de Potasio

INDICACIONES: Estreñimiento. Como el potasio en macrodosis, es un tónico cardíaco. Mejora la diuresis y ayuda a eliminar edemas. Tiene una acción antihipertensiva como cuando damos cloruro o gluconato de potasio en cucharadas (Ion K. K Laproff.). Se debería usar en las personas que toman diuréticos. El potasio que se encuentra en los suplementos multivitamínicos no es de ninguna utilidad pues solo aporta algunos miligramos (40 mg), y no tiene acción como oligoelemento porque no está en el ámbito de microgramos ni se encuentra en disolución. Así, este potasio no es agua ni es pescado.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

YODO

COMPOSICION: Gluconato de Yodo

POSOLOGIA: Respiratorio: Afecciones pulmonares, Tuberculosis, Bronquitis.

Endocrino: Trastornos de la vejez. Aumento del colesterol.

Osteoligamentario: Reumatismos, Raquitismos,

Ginecología: Dismenorrea hiper o hipo

Tegumentario: Enfermedades de la piel, Caída o déficit del crecimiento del cabello, Uñas frágiles y estriadas.

Metabolismo en sangre: Déficit de defensas, especialmente fagocitarias. Descongestivo. Toxemias, Depurativo.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.

ZINC

COMPOSICION: Gluconato de Zinc

INDICACIONES: Posee un efecto regulador de los trastornos de las funciones "hipofisiarias", y de las "funciones gonadotropas" en particular. Merece la pena prescribirlo para los adiposogenitales, bien solo, o bien con una opoterapia a base de extractos hipofisiarios. Además de esta indicación particular, el Zinc es un catalizador muy importante en terapéutica siempre que se asocie con cobre, níquel o Cobalto

CONTRAINDICACIONES: No se conocen

REACCIONES ADVERSAS: No se conocen

INTERACCIONES: No se conocen

POSOLOGIA: Tomar 10 gotas con agua, día de por medio por 3 meses.

Dosis de Mantenimiento: tomar 10 gotas 3 veces al día por quince días, tres veces al día durante quince días, luego 10 gotas una vez al día en ayunas en un poco de agua de tres a cuatro meses.

PRESENTACION: Frascos cuentagotas de 30 ml.